

كيف يتم تطبيق لقاح جائحة الـ COVID-19 المقتول؟ (CoronaVac)



- قوموا بتطبيق اللقاح أثناء جلوس الشخص.
- قم بقراءة مصفوفة البيانات الموجودة على عبوة اللقاح من خلال فتح تطبيق "AŞILA".
- قوموا برج القارورة بشكل جيد قبل الاستخدام.
- لا يوجد محقن ضمن عبوة اللقاح. قوموا بالتطبيق عبر محقن اللقاح القياسي.
- قوموا بتطبيق 0.5 مل داخل العضلة بزاوية 90 درجة لدى الأشخاص بعمر 18 عاماً وما فوق.
- تأكدوا من عدم مغادرة الشخص للمؤسسة الصحية لمدة 15 دقيقة (30 دقيقة لدى الشخص الذي لديه قصة حساسية) بعد التلقيح.

ما الذي يجب أن ننتبه له؟

- قوموا بتطبيق اللقاح بعد فتح القارورة فوراً.
- من المفضل أن تقوموا بتطبيق اللقاح على الذراع اليسرى للتمكن من متابعة الآثار غير المرغوب بها.
- دعوا أسبوعين على الأقل بين تطبيق لقاح جائحة الـ COVID-19 المقتول واللقاحات ضد الأنفلونزا الموسمية والمكورات الرئوية والمكورات السحائية وغيرها من اللقاحات الروتينية المقتولة.
- دعوا فترة أربعة أسابيع على الأقل بين تطبيق لقاح جائحة الـ COVID-19 المقتول واللقاحات الحية.

