

# من هم الذين ينصحون بعدم تلقي لقاح الـ COVID-19 المقتول؟

لن يتم إعطاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً لقاح الـ COVID-19 حالياً لعدم كونهم مدرجين ضمن مجموعة الخطر ذات الأولوية التي حددها المجلس العلمي لفيروس الكورونا بوزارة الصحة في الجمهورية التركية.

لا توجد بيانات حول إعطاء لقاح الـ COVID-19 المقتول خلال الحمل أو الرضاعة. يمكن إعطاء اللقاح للنساء الحوامل أو المرضعات المعرضات لخطر الإصابة الشديدة بالـ COVID-19 بناءً على طلبهن. يفضل عدم إعطاء اللقاح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

لن يتم تطبيق لقاح الـ COVID-19 المقتول على الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالـ COVID-19 عن طريق اختبار الـ PCR والأشخاص الذين كانوا على تماس مع حالات الـ COVID-19 في غضون 10 أيام قبل التلقيح.



وزارة الصحة في الجمهورية التركية

[covid19asi.saglik.gov.tr](https://covid19asi.saglik.gov.tr)



/saglikbakanligi

إننا نتجاوز الـ COVID-19  
عبر التدابير واللقاح

## أكثر المعلومات صحة حول لقاح الـ COVID-19 المقتول



[covid19asi.saglik.gov.tr](https://covid19asi.saglik.gov.tr)



وزارة الصحة في الجمهورية التركية

## هل يتوجب علي الاستمرار بالإلتزام بتطبيق قواعد القناع والمسافة والنظافة بعد تلقي اللقاح؟

عادة ما يستغرق اكتساب المناعة ضد المرض عدة أسابيع بعد تلقي اللقاح. ومع ذلك، قد لا يتطور المستوى نفسه من المناعة لدى الجميع. عدا عن ذلك، يمكن للشخص الذي تلقى اللقاح أن يصاب بالفيروس حتى وإن كانت لديه مناعة. لهذا السبب، يجب اتباع قواعد القناع والمسافة والنظافة بعد تلقي اللقاح أيضاً.

يجب الاستمرار في اتخاذ هذه الإجراءات حتى قيام وزارتنا بالإعلان عن أنه لم تعد هناك حاجة لاتخاذ التدابير.



## ما هو لقاح الـ COVID-19 المقتول؟

لقاح الـ COVID-19 المقتول هو اللقاح غير حي للفيروس يمكن له أن يخلق استجابة مناعية في الجسم والذي يتم الحصول عليه عن طريق إزالة الميزة المسببة للمرض عبر التطبيقات الكيميائية والفيزيائية لدى فيروس الكورونا المستجد (SARS-CoV-2) الذي يتسبب بالإصابة بالـ COVID-19.

## هل لقاحات الـ COVID-19 المقتولة فعالة في الوقاية من المرض؟

أظهرت الدراسات السريرية أن لقاحات الـ COVID-19 فعالة عالية في الوقاية من المرض.

## هل هناك أية تأثيرات جانبية للقاحات الـ COVID-19 المقتولة؟

لم تتم مواجهة أية تأثيرات جانبية خطيرة حتى اليوم سواءً خلال الدراسات السريرية التي أجريت على لقاحات الـ COVID-19 أو خلال عمليات التلقيح التي تجري حالياً للقاحات الحالية. إن التأثيرات الجانبية التي شوهدت بعد التلقيح خفيفة عادة.

وهي؛ أعراض جانبية خفيفة مثل الإرهاق والصداع والحمى والقشعريرة والآلام في العضلات / المفاصل والإقياء والإسهال والألم والاحمرار والتورم في منطقة إعطاء اللقاح. ومع ذلك، ينبغي ألا ننسى وجوب مراجعة أقرب مؤسسة صحية في حال ظهور أي إنزعاج بعد تلقي اللقاح دون تجاهل ردود الفعل التحسسية النادرة وإبلاغ الطبيب بمعلومة تلقي اللقاح خلال فترة قريبة.

