

التحذيرات

■ يوصى بتأجيل إعطاء اللقاح لفترة من الزمن عند وجود الحمى (38 درجة مئوية وما فوق) والأمراض التي لم تتضح الصورة السريرية فيها بعد ونوب الأمراض المزمنة.

■ لن يتم تطبيق لقاح الـ COVID-19 المقتول على الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالـ COVID-19 عن طريق اختبار الـ PCR والأشخاص الذين كانوا على تماس مع حالات الـ COVID-19 في غضون 10 أيام قبل التلقيح حتى صدور قرار آخر.

■ لا توجد بيانات حول إعطاء لقاح الـ COVID-19 المقتول خلال الحمل. يمكن إعطاء اللقاح للنساء الحوامل المعرضات لخطر الإصابة الشديدة بالـ COVID-19 بناءً على طلبهن. يفضل عدم إعطاء اللقاح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

■ لا توجد بيانات حول إعطاء لقاح الـ COVID-19 المقتول خلال فترة الرضاعة. يمكن إعطاء اللقاح للنساء المرضعات لخطر الإصابة الشديدة بالـ COVID-19 بناءً على طلبهن.



■ يتم اتخاذ قرار التلقيح بناءً على التقييم الذي يتم إجراؤه من قبل طبيب المتابعة لدى أولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بأمراض عصبية مثل الصرع غير المضبوط ومتلازمة غيلان باريه والتهاب النخاع المستعرض يمكن لها أن تتفاقم بسبب الإنتان واللقاح.

■ يجب أن يتلقى الأشخاص مثبتي المناعة اللقاح بناءً على تقييم طبيب المتابعة من أجل تحديد النطاق الذي قد تكون فيه الاستجابة للقاح أفضل. يجب أن يتم تطبيقه على شكل جرعتين تفصل بينهما أربعة أسابيع بحيث تعطى جرعة واحدة في كل مرة.

■ قد يتسبب الحقن العضلي بحدوث النزف لدى المرضى الذين يعانون من نقص الصفائح واضطرابات النزف.

■ لا يتم تطبيق اللقاح على الأشخاص الذين لديهم قصة حساسية / تأق ضد أي مادة موجودة ضمن اللقاح.

■ لا تعطى الجرعة الثانية من اللقاح في وجود قصة تأق بعد تطبيق الجرعة الأولى من لقاح الجائحة.



وزارة الصحة
في الجمهورية التركية

قواعد تطبيق لقاح وباء الـ COVID-19 المقتول



covid19asi.saglik.gov.tr

Facebook Twitter Instagram /SaglikBakanligi



المعلومات العامة

■ لقاح وباء الـ COVID-19 المقتول (CoronaVac) معلب على شكل جرعة واحدة جاهزة للاستخدام ضمن قارورة دون إبرة حقن.

■ الجرعة الواحدة عبارة عن 0.5 مل.

■ يتم تطبيقه داخل العضلة (الحقن داخل العضلة) بزاوية 90 درجة بمقدار 0.5 مل لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً وما فوق.

■ يتم تطبيقه على شكل جرعتين تفصل بينهما أربعة أسابيع بحيث تعطى جرعة واحدة في كل مرة لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً وما فوق.

■ يجب تطبيقه باستخدام إبرة حقن لقاح قياسية.

■ يجب رجه جيداً قبل الاستخدام.

■ يفضل تطبيقه على الذراع اليسرى لمتابعة الآثار غير المرغوب بها بعد التلقيح.

■ يجب تطبيق اللقاح على الشخص وهو في وضعية الجلوس.

■ يجب تزويد الشخص بالمعلومات حول ردود الفعل التحسسية المحتملة بعد إعطاء اللقاح ويجب التأكد من عدم مغادرة الشخص للمؤسسة الصحية خلال مدة 15 دقيقة (مدة 30 دقيقة لدى الشخص الذي لديه قصة حساسية). يجب إخباره بمراجعة أقرب مؤسسة صحية في حال ظهور أية آثار جانبية في الفترة اللاحقة.

■ إنه يتأثر بضوء الشمس، يجب حمايته من الضوء.

■ إنه قابل للتجمد، يجب الحرص على عدم تجمد اللقاح. يجب تخزينه بين درجة حرارة من 2+ إلى 8+ درجة مئوية. يجب تخزينه في أي من رفوف ثلاجة اللقاح. في الثلاجات مانعة التجمد التي ليست لها ميزة ثلاجات اللقاح، يفضل تخزينها على الرف الثاني من الأعلى قريباً من غطاء الرف بحيث لا يلمس الجدار الداخلي للثلاجة ولا يكون أمام قنوات ضخ الهواء. يفضل أن يكون هناك مؤشر تجمد داخل الثلاجة. يجب توفير سلسلة التبريد وفقاً لتعميم برنامج التلقيح الموسع.

■ يجب التخطيط لإعطاء لقاح جائحة الـ COVID-19 (CoronaVac) بعد فتح القارورة مباشرة.

■ يجب تطبيق كلتا جرعتي اللقاح بنوع لقاح الجائحة نفسه.

■ تجب قراءة باركود اللقاح قبل تطبيقه بشكل مؤكد. سيتم تقييد المعلومات الخاصة بالتلقيح عبر الوصول إلى تطبيق "AŞILA".

■ سيتم الإبلاغ عن التأثيرات الجانبية المبكرة والمتأخرة التي قد تحدث بعد إعطاء لقاحات وباء الـ COVID-19 عبر نظام إدارة الصحة العامة (HSYS) أو نظام معلومات طب الأسرة (AHBS) أو نظام إدارة معلومات المشافي (HBYS).

■ يمكن اتباع خطوات تطبيق اللقاح من "قائمة التحقق من تطبيق لقاح الـ COVID-19 المقتول (CoronaVac)".



حالة التطبيق مع اللقاحات والعلاجات الأخرى

■ لا توجد بيانات تجارب سريرية فيما يتعلق بتأثير تطبيق لقاحات أخرى (قبله أو بعده أو معه) على مناعة هذا اللقاح. ومع ذلك وبالنظر إلى تطبيقات اللقاحات المقتولة السابقة، فإن سيتم التقييم بالنظر إلى حالة إصابة الشخص بالـ COVID-19 وحالة تواجده ضمن مجموعات الخطر من أجل ضمه لمجموعات لقاحات مجموعات الخطر.

■ من المناسب ترك فاصل أسبوعين على الأقل (قبل وبعد) بين اللقاح ضد جائحة الـ COVID-19 المقتول ولقاحات الأنفلونزا الموسمية والمكورات الرئوية والمكورات السحائية وغيرها من اللقاحات الروتينية المقتولة.

■ من المناسب ترك فاصل أربعة أسابيع على الأقل (قبل وبعد) بين اللقاح ضد جائحة الـ COVID-19 المقتول واللقاحات الحية.

■ يمكن تطبيق اللقاحات التالية للتعرض مثل لقاح داء الكلب والكزاز دون ترك فاصل زمني.