

UYARILAR

- Aşı uygulaması 38°C ve üstü ateşi olan kişilerde, henüz kesin tanı konulamamış akut hastalığı olanlarda, kronik hastalıkların akut atakları sırasında ertelenmelidir.
- İkinci bir talimata kadar, inaktif Pandemik COVID-19 aşısı; aktif COVID-19 geçirenlere, COVID-19'u geçirmiş (PCR testi ile doğrulanmış) kişilere ve aşı yaptırmadan önceki 10 gün içerisinde doğrulanmış bir COVID-19 vakasıyla temas etmiş kişilere uygulanmayacaktır.
- Gebelikte inaktif Pandemik COVID-19 aşısının (CoronaVac) uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19'u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir. Aşının gebeliğin ilk üç ayında uygulanmaması tercih edilir.
- Emzirme döneminde inaktif Pandemik COVID-19 aşısının (CoronaVac) uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19'u ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir.



- Kontrolsüz epilepsi ve Guillain-Barre Sendromu, transvers myelit gibi enfeksiyonla ve aşıyla alevlenebilen nörolojik hastalık tanısı bulunanlara takip eden klinisyen tarafından yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak aşılanma kararı verilir.
- İmmün suprese kişilere aşı yanıtının en iyi olabileceği aralığı saptayabilmek için takip eden klinisyenin değerlendirmesine bağlı olarak aşı uygulanmalıdır. Dört hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz olarak uygulanmalıdır.
- Trombositopeni ve kanama bozukluğu olan hastalarda intramüsküler enjeksiyon kanamaya neden olabilir.
- Aşının içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı alerji/anafilaksi öyküsü olan kişilere aşı uygulanmaz.
- Pandemik aşının ilk dozu sonrasında anafilaksi öyküsü varlığında ikinci doz uygulanmaz.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SAĞLIK BAKANLIĞI

İNAKTİF PANDEMİK COVID-19 AŞISI UYGULAMA KURALLARI



covid19asi.saglik.gov.tr

Facebook Twitter Instagram /SaglikBakanligi



GENEL BİLGİLER

- İnaktif Pandemik COVID-19 aşısı (CoronaVac), tek dozluk kullanıma hazır flakonda enjektörsüz olarak paketlenmiştir.
- 1 doz 0,5 ml'dir.
- 18 yaş ve üstü kişilere 0,5 ml olarak 90° açı ile kas içine (intramusküler) uygulanır.
- 18 yaş ve üstü kişilere dört hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz uygulanır.
- Uygulama standart aşı enjektörü ile yapılmalıdır.
- Kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır.
- Aşı sonrası istenmeyen etki takibi yapılabilmesi için sol koldan uygulanması tercih edilir.

- Aşı kişiye oturur durumdayken uygulanmalıdır.
- Aşı uygulamasından sonra olası alerjik reaksiyonlar açısından kişi bilgilendirilmeli ve kişinin 15 dakika süresince (alerji öyküsü olan kişinin 30 dakika süresince) sağlık tesisinden ayrılmaması sağlanmalıdır. Daha sonraki dönemde de herhangi bir yan etki gelişmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurması söylenmelidir.
- Gün ışığına karşı duyarlıdır, ışıktan korunmalıdır.
- Donmaya karşı duyarlıdır, aşının donmamasına dikkat edilmeli, +2 ila +8 °C'de saklanmalıdır. Aşı dolabının herhangi bir rafında muhafaza edilebilir. Aşı dolabı özelliği bulunmayan no-frost dolaplarda ise dolap iç cidarına temas etmeyecek ve üfleme kanallarının önünde olmayacak şekilde tercihen üstten ikinci rafta ve rafın kapağa yakın tarafında saklanmalıdır. Dolap içerisinde tercihen donma göstergesi bulunmalıdır. Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi'ne uygun soğuk zincir sağlanmalıdır.
- İnaktif Pandemik COVID-19 (CoronaVac) aşısı flakonu açıldıktan sonra hemen uygulanacak şekilde planlanma yapılmalıdır.
- Aşılamanın her iki dozu da aynı pandemik aşı ile yapılmalıdır.
- Aşı uygulaması öncesinde mutlaka karekod okutulmalıdır. Aşılamaya ilişkin bilgiler "AŞILA" mobil uygulamasına erişilerek kaydedilecektir.
- Pandemik COVID-19 aşılarının uygulanması sonrasında ortaya çıkabilecek erken ve geç istenmeyen etkiler Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS), Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) veya Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinden bildirilecektir.
- Aşı uygulaması basamakları "İnaktif Pandemik COVID-19 Aşısı (CoronaVac) Uygulaması Kontrol Listesi"nden takip edilebilir.



DiĞER AŞI VE TEDAVİLERLE UYGULANMA DURUMU

- Diğer aşılardan eşzamanlı (öncesinde, sonrasında veya aynı anda) uygulanmasının bu aşının immünojenitesi üzerindeki etkisine ilişkin klinik çalışma verisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, daha önceki inaktif aşı uygulamaları dikkate alınarak, kişinin COVID-19 ve risk grubu aşılama için risk grubunda yer alma durumu da değerlendirilerek
 - İnaktif Pandemik COVID-19 aşılması ile mevsimsel influenza, pnömokok, meningokok ve diğer inaktif rutin aşılardan arasında (öncesinde ve sonrasında) en az iki hafta süre bırakılması uygundur.
 - İnaktif Pandemik COVID-19 aşılması ile canlı aşılardan arasında (öncesinde ve sonrasında) ise en az dört hafta süre bırakılması uygundur.
- Kuduz ve tetanos aşısı gibi temas sonrası uygulanması gereken aşılardan zaman aralığı bırakılmaksızın uygulanabilir.