

İNAKTİF PANDEMİK COVID-19 AŞISI (CoronaVac) NASIL UYGULANIR?



- Aşığı kişi oturur durumdayken uygulayın.
- Aşı ambalajındaki karekodu "AŞILA" uygulamasını açarak okutun.
- Kullanmadan önce flakonu iyice çalkalayın.
- Aşı ambalajının içinde enjektör bulunmamaktadır. Uygulamayı standart aşı enjektörüyle yapın.
- 18 yaş ve üstü kişilere 0,5 ml olarak 90° açı ile kas içine (intramüsküler) uygulayın.
- Aşı uygulamasından sonra kişinin 15 dakika süresince (alerji öyküsü olan kişinin 30 dakika süresince) sağlık tesisinden ayrılmamasını sağlayın.

NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

- Aşığı flakonu açtıktan hemen sonra uygulayın.
- İstenmeyen etki takibi yapılabilmesi için aşığı tercihen sol koldan uygulayın.
- İnaktif Pandemik COVID-19 aşılması ile mevsimsel influenza, pnömokok, meningokok ve diğer inaktif rutin aşılar arasında en az iki hafta süre bırakın.
- İnaktif Pandemik COVID-19 aşılması ile canlı aşılar arasında en az dört hafta süre bırakın.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SAĞLIK BAKANLIĞI

saglik.gov.tr
covid19asi.saglik.gov.tr


/SaglikBakanligi